

# INFORMACJA DO S -1

(parch jabłoni)

**z dnia 20.04.2011**

W celu stałego zabezpieczenia pąków przed zakażeniem przez parch jabłoni należy zapobiegawczo wykonać opryskiwanie jednym z niżej podanych środków ochrony roślin w odstępach 5-7 dni w miarę rozwoju tych pąków. **Zalecenia dotyczą sytuacji, kiedy nie stwierdza się zdecydowanych infekcji i nie są sygnalizowane terminy zakażeń.**

Zalecane środki:

Dawka na 1/ha

<b>MERPAN 80 WG</b>	<b>1,9 kg</b>
<b>DELAN 700 WG</b>	<b>0,5 -0,75 kg</b>
<b>DITHANE NEO-TEC 75 WG</b>	<b>3,0 - 4,5 kg</b>
<b>FOLPAN 80 WG</b>	<b>3,0 kg</b>
<b>KAPTAN zaw. 50 WP</b>	<b>3,0 kg</b>
<b>ANTRACOL 70 WG</b>	<b>2,0-2,25 kg</b>
<b>POLYRAM 70 WG</b>	<b>3,0 - 4,5 kg</b>

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***

# INFORMACJA DO **S-17**

**z dnia 20.04.2011**

## **o zwalczaniu zwójek liściowych i innych gąsienic zjadających liście**

W sadach, w których stwierdza się liczne występowanie wymienionych szkodników, należy wykonać opryskiwanie stosując jeden z następujących środków ochrony roślin:

Zalecane insektycydy:

Dawka na 1 ha

<b>FASTAC 100 EC</b>	<b>0,18 l</b>
<b>KARATE ZEON 050 CS</b>	<b>0,15 - 0,2 l</b>
<b>STEWARD 30 WG</b>	<b>0,17 - 0,2 kg</b>

**UWAGA !**

**STEWARD** nie zwalcza mszyc i kwieciaka jabłkowca.

**Środki z grupy syntetycznych pyretroidów stosować nie częściej niż 1 raz w sezonie.**

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***