

# INFORMACJA DO S -1

(Parch jabłoni)

**z dnia 04.04.2011**

## **Zalecenia ochrony na okres od pęknięcia pąków do fazy mysich uszek**

W celu stałego zabezpieczenia pąków przed zakażeniem przez parch jabłoni należy zapobiegawczo wykonać opryskiwanie jednym z niżej podanych środków ochrony roślin w odstępach 5-7 dni w miarę rozwoju tych pąków. **Zalecenia dotyczą sytuacji, kiedy nie stwierdza się zdecydowanych infekcji i nie są sygnalizowane terminy zakażeń.**

Zalecane środki:

Dawka na 1/ha

NEORAM 37,5 WG	2 kg
NORDOX 75 WG	0,75-1 kg
CUPROFLOW 375 SC	1,5-2 l
CHAMPION 50 WP	0,75 kg
FUNGURAN –OH 50 WP	0,75 kg
MIEDZIAN 50 WP/ 50WG	1,5 kg
MIEDZIAN EXTRA 350 SC	1,5 – 2,0 l
MERPAN 80 WG	1,9 kg
DELAN 700 WG	0,5 -0,75 kg
DITHANE NEO-TEC 75 WG	3,0 - 4,5 kg
FOLPAN 80 WG	3,0 kg
KAPTAN zaw. 50 WP	3,0 kg
ANTRACOL 70 WG	2,0-2,25 kg
POLYRAM 70 WG	3,0 - 4,5 kg

### **UWAGA !**

Środki miedziowe zaleca się stosować w fazie pęknięcia pąków do fazy ukazywania się pierwszych liści - ograniczają występowanie zarazy ogniowej .

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***