

INFORMACJA DO **S-16**

Z DNIA 04.04.2011 **o zwalczaniu kwieciaka jabłkowca**

W sadach w których w roku ubiegłym **obserwowano liczne uszkodzenia pąków kwiatowych**, należy wykonać opryskiwanie drzew w okresie nabrzmiewania lub pęknięcia pąków stosując jeden z wymienionych środków ochrony roślin. Opryskiwanie wykonać w dni słoneczne przy temp. powyżej + 12⁰ C.

ZALECANE ŚRODKI	DAWKA na 1 ha
ACTARA 25 WG	0,16-0,18 kg
CALYPSO 480 SC	0,15 l
FASTAC 100 EC	0,15 -0,18 l
KARATE ZEON 050 CS	0,2 l

Zalecenia:

Szkodliwość kwieciaka jabłkowca zależy od intensywności kwitnienia jabłoni. Jeśli pąków jest mało, żerujący chrząszcz może zniszczyć większość z nich. Natomiast w przypadku obfitego kwitnienia kwieciak jedynie przerzedza je.

Próg szkodliwości dla kwieciaka jabłkowca wynosi:
od 5 do 10 chrząszczy strząśniętych z 35 gałęzi na płachtę entomologiczną wiosną w fazie pęknięcia pąków, w okresie bezlistnym strząsanie należy przeprowadzać w dzień słoneczny, w południe przy temperaturze powietrza 10-12 o C

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.