

# INFORMACJA DO **S-32**

**z dnia 04.04.2011r.**

## **o zwalczaniu miodówek gruszowych**

**Sadom gruszowym zagrażają miodówki, należy stosować opryskiwania wg podanego programu :**

**I. TERMIN - w fazie nabrzmiewania pąków w temp. powyżej +15<sup>0</sup> C,**  
**w słoneczny dzień, stosując :**

<b>ACTARA 25 WG</b>	<b>w dawce</b>	<b>0,16-0,2 kg/ha</b>
---------------------	----------------	-----------------------

**II. TERMIN - tuż przed kwitnieniem ( biały pąk kwiatowy )**

<b>RIMON 100 EC</b>	<b>”</b>	<b>0,75 l/ha</b>
---------------------	----------	------------------

<b>DIMILIN 25 WP</b>	<b>”</b>	<b>0,6 – 0,9 kg/ha</b>
----------------------	----------	------------------------

**III. TERMIN - po kwitnieniu –**

<b>ACTARA 25 WG</b>	<b>w dawce</b>	<b>0,16-0,2 kg/ha</b>
---------------------	----------------	-----------------------

<b>RIMON 100 EC</b>	<b>”</b>	<b>0,75 l/ha</b>
---------------------	----------	------------------

<b>DIMILIN 25 WP</b>	<b>”</b>	<b>0,6 – 0,9 kg/ha</b>
----------------------	----------	------------------------

**IV. TERMIN - okres wzrostu owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków**

<b>ACTARA 25 WG</b>	<b>w dawce</b>	<b>0,16-0,2 kg/ha</b>
---------------------	----------------	-----------------------

<b>RIMON 100 EC</b>	<b>”</b>	<b>0,75 l/ha</b>
---------------------	----------	------------------

<b>DIMILIN 25 WP</b>	<b>”</b>	<b>0,6 – 0,9 kg/ha</b>
----------------------	----------	------------------------

### **UWAGA !**

1. Do cieczy roboczej **należy koniecznie dodać zwilżacz.**

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin***