

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w BELSKU

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	9.6	84	100	78	62
2011-05-14	0.2	70	100	100	100
2011-05-15	9.2	90	100	74	59
2011-05-16	0.2	96	100	100	97

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w BŁĘDOWIE

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	6.2	84	100	82	66
2011-05-14	0.0	71	100	100	86
2011-05-15	8.0	90	100	70	56
2011-05-16	0.2	97	100	100	92

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w HUCIE BŁĘDOWSKIEJ

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	1.8	77	100	96	77
2011-05-14	0.0	65	0	0	0
2011-05-15	8.2	90	100	79	63
2011-05-16	0.2	98	100	100	99

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w IGNACOWIE k/JASIEŃCA

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	4.0	88	100	92	73
2011-05-14	0.2	76	100	100	94
2011-05-15	8.8	93	82	45	36
2011-05-16	0.0	99	100	89	72

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w BRONISZEWIE

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	6.4	81	100	67	53
2011-05-14	0.2	69	100	67	53
2011-05-15	9.4	86	80	45	36
2011-05-16	0.2	94	100	84	68

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w OLSZEWIE

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFIEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	5.0	85	100	93	74
2011-05-14	0.2	71	100	100	91
2011-05-15	8.2	91	100	69	55
2011-05-16	0.0	98	100	100	91

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w OLKOWICACH

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFЕКCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	6.2	84	100	70	56
2011-05-14	0.0	73	100	72	58
2011-05-15	11.4	88	83	46	37
2011-05-16	0.0	96	100	81	66

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w CHYNOWIE

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	2.4	79	74	49	39
2011-05-14	0.0	71	0	0	0
2011-05-15	8.8	86	79	43	34
2011-05-16	0.0	95	100	86	69

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w CIECHLINIE

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	9.6	86	100	62	50
2011-05-14	0.2	75	100	54	44
2011-05-15	9.0	93	100	99	79
2011-05-16	0.2	96	100	100	100

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w CZERSKU

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFЕКCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	2.4	79	71	47	38
2011-05-14	0.0	69	0	0	0
2011-05-15	10.6	90	79	40	32
2011-05-16	0.2	92	100	92	74

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w GRZEGORZEWICACH

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFIEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	4.6	87	100	83	67
2011-05-14	0.2	75	60	14	13
2011-05-15	7.0	95	100	100	92
2011-05-16	0.0	97	100	100	100

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w JASIEŃCU

DATA	OPAD	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	Y		SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
	mm	%			
2011-05-13	3.8	89	100	70	56
2011-05-14	0.0	75	100	85	69
2011-05-15	7.2	91	72	41	33
2011-05-16	0.2	96	100	87	70

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w KONARACH

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFIEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	3.4	79	73	48	38
2011-05-14	0.0	71	0	0	0
2011-05-15	8.0	87	88	48	38
2011-05-16	0.2	92	100	84	68

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w STAREJ WARCE

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFIEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	3.0	83	72	49	39
2011-05-14	0.0	75	51	12	11
2011-05-15	8.4	88	77	42	33
2011-05-16	0.0	95	100	92	74

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w TARCZYNIE

DATA	OPADY	WILG. POW. %	% INFEKCJI		
	mm		SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	4.2	87	100	71	57
2011-05-14	0.0	76	91	39	32
2011-05-15	7.6	95	100	78	62
2011-05-16	0.2	95	100	100	92

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w WILKOWIE

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFЕКCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	7.4	85	100	100	100
2011-05-14	0.0	74	100	100	100
2011-05-15	8.0	94	100	100	100
2011-05-16	0.2	94	100	100	100

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w WĘŻOWCU

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	2.6	83	100	72	58
2011-05-14	0.0	75	34	16	13
2011-05-15	6.6	94	82	50	40
2011-05-16	0.0	95	100	95	77

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w GOLIACH

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	7.0	89	100	67	54
2011-05-14	0.2	73	100	81	67
2011-05-15	9.2	91	100	65	52
2011-05-16	0.0	94	100	100	86

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

INFORMACJA DO S -10

Interwencyjny bezpośrednio po kwitnieniu

z dnia 16.05.2011 o zwalczaniu parcha jabłoni

Na podstawie pomiarów dokonanych w PEŁAWIU

DATA	OPADY	WILG. POW.	% INFEKCJI		
	mm	%	SŁABEJ	ŚREDNIEJ	SILNEJ
2011-05-13	2.6	77	81	53	42
2011-05-14	0.0	69	2	1	1
2011-05-15	7.2	89	76	45	36
2011-05-16	0.0	93	100	95	77

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
ARDENT 500 SC	0,2 l	48 godz.
DISCUS 500 WG + DELAN 700 WG	0,2 kg + 0,3 kg	48 godz.
ZATO 50 WG	0,15 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy strobiluryn i triazoli stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych.

Fungicydów triazolowych nie stosować przy temperaturze poniżej 12oC

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato, Chorus, Mythos.**

Liczba opryskiwań jednoskładnikowymi fungicydami systemicznymi i w mieszankach nie powinna przekraczać 2 zabiegów w sezonie.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.