

**z dnia 16.05.2011**

## **o zwalczaniu szarej pleśni na truskawkach**

W celu zabezpieczenia plantacji truskawek przed szarą pleśnią, należy opryskiwać je w następujących terminach, stosując jeden z podanych preparatów:

**Pierwszy zabieg** - na początku kwitnienia (10 % kwiatów w stadium białego pąka). Następne zabiegi – stosować co 5 - 7 dni przestrzegając okresów karencji

<u>Preparat</u>	<u>Dawka na 1 ha</u>	<u>Karencja - dni</u>
<b>FOLPAN 80 WG</b>	<b>2,0 kg</b>	<b>3</b>
<b>MYTHOS 300 SC</b>	<b>2,5 l</b>	<b>7</b>
<b>SIGNUM 33 WG</b>	<b>1,8 kg</b>	<b>3</b>
<b>SWITCH 62,5 WG</b>	<b>0,8-1,0 kg</b>	<b>3</b>
<b>POMARSOL 80 WG</b>	<b>4,0 kg</b>	<b>7</b>
<b>SADOPLON 75 WP</b>	<b>4-5 kg</b>	<b>7</b>
<b>THIRAM GRAN. 80 WG</b>	<b>4,0 kg</b>	<b>7</b>
<b>TELDOR 500 SC</b>	<b>1,5 l</b>	<b>1</b>

### **UWAGA!**

1. Do ostatniego opryskiwania nie stosować preparatów zawierających tiuram.
2. **Teldor 500 SC** stosować przed i pomiędzy zbiorami, uwzględniając karencję środka.
3. **Pomarsol, Sadoplon, Thiram** - zwalczają białą plamistość liści truskawki
4. Nie opryskiwać w czasie oblotu pszczół.
5. Wyższe dawki stosować przy użyciu belki polowej.

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin***