

INFORMACJA DO **S-44**

z dnia 28.03.2012

PROGRAM OCHRONY WIŚNI I CZEREŚNI PRZED RAKIEM BAKTERYJNYM

Opryskiwanie należy przeprowadzić jednym z podanych środków w następujących terminach:

1. Faza nabrzmiewania pąków

	Dawka na 1 ha
NORDOX 75 WG	2,0 kg
CUPROFLOW 375 SC	3,0 l
NEORAM 37,5 WG	3,0 kg
MIEDZIAN 50 WP	3,0 kg
MIEDZIAN Extra 350 SC	3,0 l

2. Faza kwitnienia - tylko odmiany wrażliwe i tylko w czasie opadów

NORDOX 75 WG	1,0 kg
CUPROFLOW 375 SC	2,0 l
NEORAM 37,5 WG	2,0 kg
MIEDZIAN 50 WP	1,5 kg
MIEDZIAN Extra 350 SC	1,5 l

Opryskiwać korony drzew do całkowitego ich zwilżenia.

Odmiany mało wrażliwe:

wiśnie - Northstar, Łutówka, Groniasta z Ujfehertoi, Pandy 103, Lucyna, Sabina;

czereśnie - Rivan, Buttnera Czerwona, Burlat, Sam, Wczesna Riversa, Regina, Vega, Vanda, Ulster, Merton Premier, Summik;

Odmiany wrażliwe:

wiśnie – Nefris, Wanda;

czereśnie - Hedelfińska, Van, Marchijska.

Fungicydy miedziowe stosowane w okresie kwitnienia ograniczają występowanie **dziurkowatości liści i brunatnej zgnilizny drzew pestkowych.**

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.