

**KOMUNIKAT z dnia 23.04.2012r.****o zwalczaniu parcha jabłoni**

Według pomiarów dokonanych na stacjach I-METOS ilość opadów w dniach 22 i 23.04 w poszczególnych lokalizacjach wynosiła:

STACJA	INFEKCJA		Opad (mm)
	DATA	GODZINA	
BRONISZEW	22-23.04	Brak	14,8
JASTRZĘBIA	22-23.04	Brak	14,8
OLKOWICE	22-23.04	Brak	13,6
OLSZEW	22-23.04	23,04 g.11-13	13,2
POPOWICE	22-23.04	Brak	16,6
PROMNA	22-23.04	Brak	12,2
WĘŻOWIEC	22-23.04	Brak	14,4
WODZICZNA	22-23.04	Brak	14,6

W niektórych lokalizacjach wystąpiły krótkotrwałe słabe infekcje. Mogło nastąpić zmycie zastosowanych wcześniej fungicydów. Jest bardzo intensywny przyrost tkanki liściowej.

**Zalecane zabiegi środkami o działaniu kontaktowym a w uzasadnionych przypadkach interwencyjnym.**

Zalecane środki:	Dawka na 1/ha
<b>MERPAN 80 WG</b>	<b>1,9 kg</b>
<b>DELAN 700 WG</b>	<b>0,5 -0,75 kg</b>
<b>FOLPAN 80 WG</b>	<b>3,0 kg</b>
<b>KAPTAN zaw. 50 WP</b>	<b>3,0 kg</b>

Zalecane środki	Dawka na 1 ha	Czas działania interwencyjnego
<b>CARPENE 65 WP</b>	<b>1,5- 2 kg</b>	<b>72 godz.</b>
<b>CHORUS 50 WG</b>	<b>0,3 kg</b>	<b>48 godz.</b>
<b>MYTHOS 300 SC</b>	<b>1-1,5 l</b>	<b>72 godz.</b>
<b>SYLLIT 65 WP</b>	<b>1,5-2 kg</b>	<b>72 godz.</b>

**UWAGA !**

**Syllit, Carpene** - stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie - nie wykonywać opryskiwań w temp. poniżej + 6<sup>0</sup> C.

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą- instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***