

KOMUNIKAT z dnia 18.05.2012r.

o zwalczaniu parcha jabłoni

Kolejne zakażenie liści jabłoni i zawiązków nastąpiło w dniu 15.05 od godz.18.00 i trwało do 17.05 do godz.11. Ilość opadów wyniosła 20 mm. W sadach niezabezpieczonych wcześniej konieczny jest zabieg o działaniu interwencyjnym. W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,112l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	1,5-2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
TERCEL 16 WG	2-2,5 kg	
ARDENT 500 SC	0,2 l	
DISCUS 500 WG	0,2-0,3 kg	
ZATO 50 WG	0,15 kg	

UWAGA !

Fungicydy z grupy IBE zaleca się stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi (MERPAN, DELAN, FOLPAN, THIRAM, POMARSOL) w temperaturze powyżej 12°C

W niższych temperaturach stosować **Ardent, Discus, Zato** w mieszankach z fungicydami kontaktowymi.

Wymienione środki stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

