

KOMUNIKAT z dnia 14.05.2012r. **o zwalczaniu parcha jabłoni**

Kolejne zakażenie liści jabłoni i zawiązków nastąpiło w dniu 12.05 o godz.14.00. Ilość opadów 2-4 mm. W sadach niezabezpieczonych wcześniej konieczny jest zabieg o działaniu interwencyjnym. W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
DIFO 250 EC	0,2l	120 godz
SCORE 250 EC	0,2l	120 godz
CAPITAN 400 EC	0,075l	120 godz
SHAVIT F 72 WG	1,5-2,0 kg	72 godz.
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1,5-2 l	72 godz.

UWAGA !

Fungicydy z grupy IBE zaleca się stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi (MERPAN, DELAN, FOLPAN, THIRAM, POMARSOL) w temperaturze powyżej 12°C

Wymienione środki stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.