

KOMUNIKAT z dnia 25.05.2012r.**o zwalczaniu owocówki śliwkóweczki I pokolenia**

W dniach 25-28.05 należy przeprowadzić opryskiwanie śliw przeciwko owocówce śliwkóweczce na lot motyli jednym z następujących środków:

Zalecane środki	Dawka na 1 ha
DIMILIN 480 SC	0,4 l
STEWARD 30 WG	0,2 kg
SPINTOR 240 SC	0,6-0,8 l
CALYPSO 480 SC	0,2 l
MOSPILAN 20 SP	0,2 kg
SUMI-ALPHA 050 EC	0,45 l
KARATE ZEON 050 SC	0,3 l

UWAGA !

Pyretroidy stosować w temp. do 20 °C w celu zwalczenia motyli i ich jaj włącznie z „czarna główką”

Zabieg powtórzyć po 14 dniach.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

KOMUNIKAT z dnia 25.05.2012r.**o zwalczaniu nasionnicy trześniówki
i *Rhagoletis cingulata***

W dniach 25-28.05 należy przeprowadzić opryskiwanie **czereśni li wiśni odmian późnych** przeciwko nasionnicy trześniówce jednym z niżej podanych środków ochrony roślin:

Zalecane środki	Dawka na 1 ha
CALYPSO 480 SC	0,2 l
MOSPILAN 20 SP	0,2 kg

W temperaturze poniżej + 20⁰ C można stosować:

FASTAC 100 EC	0,15-0,18 l
----------------------	--------------------

UWAGA !

1. Jeżeli w sadzie występują kwitnące chwasty - należy je wykosić przed wykonaniem opryskiwania.

2. Zabieg powtórzyć po 7 dniach przestrzegając okresu karencji zastosowanych środków

Rhagoletis cingulata – drugi gatunek nasionnicy coraz powszechniejszy w Polsce

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

KOMUNIKAT z dnia 25.05.2012r.

o zwalczaniu brunatnej zgnilizny drzew pestkowych na śliwach

O zagrożeniu chorobą można wnioskować na podstawie ubiegłorocznego nasilenia choroby. W przypadku śliw rzadko dochodzi do porażenia kwiatów a także zamierania pędów. Natomiast bardzo często porażane są owoce. W okresie wzrostu owoców wykonuje się 3-4 zabiegi, w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych i podatności odmian.

Zalecane środki

Dawka na 1 ha

ORIOUS EXTRA 250 EW

0,75 l

HORIZON 250 EW

0,75 l

TOPSIN M 500 SC

1,5 l

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.