

**KOMUNIKAT**  
**Z DNIA 22.04.2013**  
**o zwalczaniu kwieciaka jabłkowca**

W sadach w których w roku ubiegłym **obserwowano liczne uszkodzenia pąków kwiatowych**, należy wykonać opryskiwanie drzew w okresie nabrzmiewania lub pękania pąków stosując jeden z wymienionych środków ochrony roślin. Opryskiwanie wykonać w dni słoneczne przy temp. powyżej + 12<sup>0</sup> C.

| ZALECANE ŚRODKI           | DAWKA na 1 ha       |
|---------------------------|---------------------|
| <b>CALYPSO 480 SC</b>     | <b>0,15 l</b>       |
| <b>DECIS MEGA 50 EW</b>   | <b>0,25 l</b>       |
| <b>FASTAC 100 EC</b>      | <b>0,15 -0,18 l</b> |
| <b>KARATE ZEON 050 CS</b> | <b>0,2 l</b>        |

**Zalecenia:**

Szkodliwość kwieciaka jabłkowca zależy od intensywności kwitnienia jabłoni. Jeśli pąków jest mało, żerujący chrząszcz może zniszczyć większość z nich. Natomiast w przypadku obfitego kwitnienia kwieciak jedynie przerzedza je.

Próg szkodliwości dla kwieciaka jabłkowca wynosi:  
od 5 do 10 chrząszczy strząśniętych z 35 gałęzi na płachtę entomologiczną wiosną w fazie pękania pąków, w okresie bezlistnym strząsanie należy przeprowadzać w dzień słoneczny, w południe przy temperaturze powietrza 10-12 o C

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-  
instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***