

KOMUNIKAT z dnia 22.04.2013 o zwalczaniu miodówek gruszowych

Sadom gruszowym zagrażają miodówki, należy stosować opryskiwania wg podanego programu :

I. TERMIN - w fazie nabrzmiewania pąków w temp. powyżej $+15^{\circ}$ C, w słoneczny dzień, stosując :

FASTAC 100 EC	w dawce	0,15-0,18 l/ha
KARTE ZEON 050 CS	„	0,15-0,2 l/ha

II. TERMIN - tuż przed kwitnieniem (biały pąk kwiatowy)

ACARAMIK 018 EC	„	0,75 l/ha
DIMILIN 480 SC	„	0,3-0,375l/ha

UWAGA !

1. Do cieczy roboczej należy koniecznie dodać zwilżacz.

Zalecenia:

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania miodówki gruszowej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji w sadzie i ocenie liczebności szkodnika. Próg zagrożenia w okresie bezlistnym to 15 miodówek strząśniętych z 35 gałęzi (po jednej z drzewa), natomiast przed kwitnieniem - 10 % pędów ze złożami jaj, a w późniejszym okresie - obecność jaj i larw na 10-20 % pędów.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin