

**KOMUNIKAT
z dnia 22.04.2013****Zalecenia ochrony na okres od pęknięcia pąków
do fazy mysich uszek**

W celu stałego zabezpieczenia pąków przed zakażeniem przez parch jabłoni należy zapobiegawczo wykonać opryskiwanie jednym z niżej podanych środków ochrony roślin w odstępach 5-7 dni w miarę rozwoju tych pąków. **Zalecenia dotyczą sytuacji, kiedy nie stwierdza się zdecydowanych infekcji i nie są sygnalizowane terminy zakażeń.**

Zalecane środki:	Dawka na 1/ha
NEORAM 37,5 WG	2 kg
NORDOX 75 WG	0,75-1 kg
CUPROFLOW 375 SC	1,5-2 l
FUNGURAN - OH 50 WP	0,75 kg
FUNGURAN A PLUS 50 WP	0,75 kg
MIEDZIAN 50 WP/ 50WG	1,5 kg
MIEDZIAN EXTRA 350 SC	1,5 – 2,0 l
MERPAN 80 WG	1,9 kg
CAPTAN 80 WG	1,9 kg
DELAN 700 WG	0,5 -0,75 kg
PENNCOZEB 80 WP	2,0 kg
VONDOZEB 75 WG	2,0 kg
DITHANE NEO-TEC 75 WG	2,0 kg
FOLPAN 80 WG	3,0 kg

UWAGA !

Środki miedziowe zaleca się stosować w fazie pęknięcia pąków do fazy ukazywania się pierwszych liści - ograniczają występowanie zarazy ogniowej

21.04 nastąpiły pierwsze wysiewy zarodników workowych, w niektórych sadach zaistniały warunki do infekcji. W zależności od stopnia rozwoju drzew może być uzasadnione zastosowanie środków **SYLLIT 65 WP 1,5-2 kg** lub **CARPENE 65 WP 1,5-2kg**

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin.