

KOMUNIKAT z dnia 13.05.2013 **o zwalczaniu brunatnej zgnilizny drzew pestkowych**

W celu zabezpieczenia wiśni i czereśni przed porażeniem brunatną zgnilizną należy wykonać opryskiwanie w **pełni kwitnienia** stosując jeden z podanych fungicydów :

Zalecane fungicydy:	Dawka na 1 ha
ORIOUS 250 EW	0,75 l
SYRIUS 250 EW	0,75 l
HORIZON 250 EW	0,75 l
TOPSIN M 500 SC	1,5 l
BUMPER 250 EC	0,45 l
SCORE 250 EC	0,2 l
KAPTAN PLUS 71,5 WP	2,0 kg
SIGNUM 33 WG	0,75-1,0 kg

UWAGA !

1. **TOPSIN M 500 SC**- zabezpiecza również przed dziurkowatością liści drzew pestkowych i drobną plamistością.
2. Fungicydy z grupy IBE należy stosować w temperaturze powyżej 12°C, przemiennie z innymi środkami i nie częściej niż 2 razy w sezonie.
3. Zaleca się wycinanie porażonych pędów.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą- instrukcją stosowania środków ochrony roślin.