

**KOMUNIKAT z dnia 6.05.2013r.****o zwalczaniu parcha jabłoni i gruszy**

Według pomiarów dokonanych na stacjach I-METOS w poszczególnych lokalizacjach ( tabela) wystąpiły infekcje. Nastąpiło zmycie zastosowanych wcześniej fungicydów. Jest bardzo intensywny przyrost tkanki liściowej. **Zalecane zabiegi środkami o działaniu interwencyjnym w mieszankach z kontaktowymi lub gotowymi mieszankami.**

Zalecane środki	Dawka na 1 ha	Czas działania interwencyjnego
<b>CARPENE 65 WP</b>	<b>1,5- 2 kg</b>	<b>72 godz.</b>
<b>CHORUS 50 WG</b>	<b>0,3 kg</b>	<b>48 godz.</b>
<b>MYTHOS 300 SC</b>	<b>1-1,5 l</b>	<b>72 godz.</b>
<b>SYLLIT 65 WP</b>	<b>1,5-2 kg</b>	<b>72 godz</b>
<b>DIFO 250 EC</b>	<b>0,2l</b>	<b>120 godz</b>
<b>SCORE 250 EC</b>	<b>0,2l</b>	<b>120 godz</b>
<b>CAPITAN 400 EC</b>	<b>0,112l</b>	<b>120 godz</b>
<b>SHAVIT 72 WG</b>	<b>1,5-2,0 kg</b>	<b>72 godz.</b>
<b>KAPTAN PLUS 71,5 WP</b>	<b>2,0 kg</b>	<b>72 godz.</b>

Środki kontaktowe:

<b>MERPAN 80 WG</b>	<b>1,9 kg</b>
<b>DELAN 700 WG</b>	<b>0,5 -0,75 kg</b>
<b>FOLPAN 80 WG</b>	<b>3,0 kg</b>
<b>KAPTAN zaw. 50 WP</b>	<b>3,0 kg</b>

**UWAGA !**

**Syllit, Carpene** - stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie - nie wykonywać opryskiwań w temp. poniżej + 6<sup>0</sup> C.

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą- instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***