

**KOMUNIKAT z dnia 27.05.2013r.****o zwalczaniu parcha jabłoni**

W ostatnich dniach intensywne opady spowodowały zmycie zastosowanych wcześniej fungicydów. Panujące warunki prowadzą do silnych infekcji. Jest bardzo intensywny przyrost tkanki liściowej.

**Zalecane zabiegi środkami o działaniu kontaktowym a w uzasadnionych przypadkach interwencyjnym.**

Zalecane środki:	Dawka na 1/ha
<b>MERPAN 80 WG</b>	<b>1,9 kg</b>
<b>CAPTAN 80 WG</b>	<b>1,9 kg</b>
<b>DELAN 700 WG</b>	<b>0,5 -0,75 kg</b>
<b>FOLPAN 80 WG</b>	<b>3,0 kg</b>
<b>KAPTAN zaw. 50 WP</b>	<b>3,0 kg</b>
<b>ZATO 50 WG</b>	<b>0,15 kg</b>
<b>FLINT 64 WG</b>	<b>1,85 kg</b>
<b>TERCEL 16 WG</b>	<b>2-2,25kg</b>

Zalecane środki	Dawka na 1 ha	Czas działania interwencyjnego
<b>CARPENE 65 WP</b>	<b>1,5- 2 kg</b>	<b>72 godz.</b>
<b>CHORUS 50 WG</b>	<b>0,3 kg</b>	<b>48 godz.</b>
<b>MYTHOS 300 SC</b>	<b>1-1,5 l</b>	<b>72 godz.</b>
<b>SYLLIT 65 WP</b>	<b>1,5-2 kg</b>	<b>72 godz.</b>

**UWAGA !**

**Syllit, Carpene** - stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie.

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***