

## **KOMUNIKAT z dnia 07.06.2013r**

### **o zwalczaniu mszyc**

W sadach, w których obserwuje się duże nasilenie mszyc, należy wykonać opryskiwanie stosując jeden z podanych środków ochrony roślin:

Zalecane środki:	Dawka na 1ha
<b>APACZ 50 WG</b>	<b>0,1-0,15 kg</b>
<b>TEPPEKI 50 WG</b>	<b>0,14 kg</b>
<b>PIRIMOR 500 WG</b>	<b>0,4-0,75 kg</b>
<b>MOVENTO 100 SC</b>	<b>2,25 l</b>
<b>ACTARA 25 WG</b>	<b>0,1 kg</b>
<b>CALYPSO 480 EC</b>	<b>0,1 - 0,2 l</b>
<b>MOSPILAN 20 SP</b>	<b>0,125 kg</b>

### **UWAGA !**

1. TEPPEKI stosować niezależnie od temperatury , działa systemicznie i przenika do młodych przyrostów co daje długotrwały efekt zwalczania mszyc
2. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dochodzi do masowego rozmnażania się mszyc (np. mszyca jabłoniowa może dać 10-16 pokoleń w ciągu roku).

*Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą- instrukcją stosowania środków ochrony roślin.*