

## **KOMUNIKAT z dnia 13.05.2013r.** **o zwalczaniu parcha jabłoni**

W związku z opadami deszczu (Tabela) wystąpiły infekcje na poziomie średnim i silnym.

W doborze środków ochrony roślin należy uwzględnić czas interwencyjnego działania.

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
<b>CHORUS 50 WG</b>	<b>0,3 kg</b>	<b>48 godz.</b>
<b>MYTHOS 300 SC</b>	<b>1,5-2 l</b>	<b>72 godz.</b>
<b>DIFO 250 EC</b>	<b>0,2l</b>	<b>120 godz</b>
<b>SCORE 250 EC</b>	<b>0,2l</b>	<b>120 godz</b>
<b>CAPITAN 400 EC</b>	<b>0,075l</b>	<b>120 godz</b>
<b>SHAVIT F 72 WG</b>	<b>1,5-2,0 kg</b>	<b>72 godz.</b>
<b>KAPTAN PLUS 71,5 WP</b>	<b>2,0 kg</b>	<b>72 godz.</b>

### **UWAGA !**

Fungicydy z grupy IBE zaleca się stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi (MERPAN, FOLPAN, THIRAM,) w temperaturze powyżej 12°C

Wymienione środki stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***