

# KOMUNIKAT z dnia 17.05.2013r.

## o zwalczaniu parcha jabłoni i gruszy

W celu stałego zabezpieczenia przed zakażeniem przez parch jabłoni należy zapobiegawczo wykonać opryskiwanie jednym z niżej podanych środków ochrony roślin w odstępach 5-7 dni w miarę rozwoju tych pąków.

**Zalecenia dotyczą sytuacji, kiedy nie stwierdza się zdecydowanych infekcji i nie są sygnalizowane terminy zakażeń.**

Zalecane środki:	Dawka na 1/ha
<b>MERPAN 80 WG</b>	<b>1,9 kg</b>
<b>CAPTAN 80 WG</b>	<b>1,9 kg</b>
<b>FOLPAN 80 WG</b>	<b>3,0 kg</b>
<b>PENNCOZEB 80 WP</b>	<b>2,0 kg</b>
<b>VONDOZEB 75 WG</b>	<b>2,0 kg</b>
<b>DELAN 700 WG</b>	<b>0,5 -0,75 kg</b>

W sadach, gdzie stwierdza się czynne plamy parcha, należy wykonać opryskiwanie wyniszczające:

Zalecane fungicydy	Dawka na 1/ha	Czas działania
<b>DIFO 250 EC</b>	<b>0,2l</b>	<b>120 godz</b>
<b>SCORE 250 EC</b>	<b>0,2l</b>	<b>120 godz</b>
<b>CAPITAN 400 EC</b>	<b>0,112l</b>	<b>120 godz</b>
<b>SYLLIT 65 WP</b>	<b>2,25 kg</b>	<b>72 godz.</b>
<b>CARPENE 65 WP</b>	<b>2,25 kg</b>	<b>72 godz.</b>

### UWAGA !

Fungicydy z grupy IBE zaleca się stosować w mieszankach z fungicydami kontaktowymi (MERPAN, DELAN, FOLPAN, THIRAM, POMARSOL ) w temperaturze powyżej 12°C

Wymienione środki stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***